




Nombre Comercial : Mac humus
Clasificación : Bioestimulante
Fabricante : Krop Ltda.

CARACTERÍSTICAS: es un bioestimulante orgánico líquido obtenido a partir de lixiviado de humus de lombriz (*Eisenia fétida*) estabilizado mediante maduración aeróbica controlada durante 6 meses. Entrega nutrientes de forma equilibrada a las plantas y actúa como potente acondicionador de suelo, aumentando la retención hídrica y la disponibilidad de sustratos para la microbiota benéfica. Favorece el desarrollo radicular, mejora la absorción de nutrientes y estimula la actividad biológica del suelo. Su proceso de estabilización asegura mayor homogeneidad, reducción de compuestos fitotóxicos y calidad consistente para sistemas agrícolas orientados a productividad y sostenibilidad.

FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN:

Suspensión concentrada
 - Envases de 6 y 23 litros.

COMPOSICIÓN:

Materia Orgánica	14,9	%
N-NO3	30,0	mg L
N-NH4	21,0	mg L
P Soluble	8,0	mg L
K Total	816,0	mg Kg
Ca Total	121,0	mg Kg
Mg Total	20,0	mg Kg
Ácidos húmicos	0,02	% (p/v)
Ácidos fúlvicos	0,13	% (p/v)

APLICACIÓN:

Aplicar vía suelo o fertirriego. Diluir en agua y aplicar inmediatamente. Aplicar dentro de las 24 h posterior a su preparación. La dosis puede ajustarse según condiciones edafoclimáticas y manejo agronómico.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con fertilizantes orgánicos e inorgánicos.

RECOMENDACIONES:

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIÓN
Cereales	10-20 L /ha	En cereales aplicar a inicio de macolla y repetir a los 15 días.
Hortalizas & flores	20-25 L /ha	Aplicar post trasplante y en desarrollo vegetativo activo. Hacer una tercera aplicación bajo condición de estrés.
Frutales	20-30 L /ha	Aplicar hasta 5 veces durante la temporada de crecimiento y producción.
Frutales menores	20 - 30 L /ha	Aplicar hasta 4 veces durante la temporada de crecimiento y producción. En frutilla realizar aplicaciones semanales en periodo de fructificación con las menores dosis.
Papas	20-25 L /ha	En papa aplicar en inicio de tuberización. En suelos pobres en MO (<2%) o sistemas intensivos usar dosis máxima



PRECAUCIONES:

Durante la preparación y aplicación utilizar ropa de protección y guantes. Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. Almacenar en un lugar seco, fresco y oscuro.

DURACIÓN: 12 meses